



ZARPAZO 290 SG

INSECTICIDA AGRÍCOLA



AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.
Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 745 1524
www.agrosarag.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57)) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Acetamiprid (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl) methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamide240 g/Kg
Emamectin Benzoate Mezcla de (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.0.20,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexopyranosyl)-α-L-arabino-hexopyranoside benzoate y (10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6S, 6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5',11,13,22-tetramethyl-2-oxo-(3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.0.20,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene)-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-3-O-methyl-4-O-(2,4,6-trideoxy-3-O-methyl-4-methylamino-α-L-lyxo-hexopyranosyl)-α-L-arabino-hexopyranoside benzoate.50 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2515

Titular del Registro:
AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

INSTRUCCIONES DE USO

ZARPAZO 290 SG, combina efectos de dos principios activos. Acetamiprid es un Agonista/antagonista del receptor de Acetilcolina de tipo Nicotínico. Imita la acción de neurotransmisor acetilcolina bloqueando los receptores e interrumpiendo la transmisión de impulsos entre las células nerviosas, mientras que Emamectin Benzoate ejerce su actividad de control en los canales de cloro; se adhiere y activa los canales de cloruro en la membrana nerviosa interrumpiendo la transferencia de iones y la transmisión de impulsos entre las células nerviosas.

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS L/Ha	P.C.	P.R.
Maíz	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	150 g/Ha	14 días	4 horas

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

ZARPAZO 290 SG Aplicar 1 vez dentro de un programa de manejo integrado de plagas, rotando con insecticidas de diferente mecanismo de acción o grupo químico para evitar desarrollo de resistencia. Se debe aplicar en infestaciones tempranas, cuando se presenten las primeras larvas. Preferiblemente aplicar sobre larvas en instares 1 y 2.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Aplicar utilizando bombas de espalda o estacionarias en buen funcionamiento y correctamente calibradas para un adecuado cubrimiento de la aplicación. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. Aplicar 200-400 L/ha de agua según el estado de desarrollo del cultivo asegurando una buena y uniforme cobertura de las plantas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

