

Rombi® KS SP

Abono CE.
Complejo especial para engorde y maduración de frutos.

Contenido Declarado


Nitrógeno (N) total: 3,0 % p/p
Nitrógeno (N) nítrico 3,0 % p/p
Óxido de potasio (K₂O): 54% p/p

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pobre en cloro
Contiene EDTA en su formulación.

Características fisicoquímicas

ASPECTO	Polvo soluble
COLOR	Incoloro
pH (150 g/L)	11,2
SOLUBILIDAD MÁXIMA	150 g/L



Características

Rombi® KS SP es un fertilizante especialmente indicado para las fases finales de cultivo. Tiene un alto contenido de potasio muy soluble y altamente asimilable por la planta. Gracias a su cuidada formulación, se consigue una mejora en la asimilación del potasio incrementando los siguientes beneficios en la planta:

- Aumenta azúcares y coloración del fruto.
- Aumenta el calibre final y el peso específico.
- Favorece la precocidad en la maduración.
- Incrementa el contenido graso en cultivos como olivar y aguacate.

Forma de aplicación y dosis

Rombi® KS SP está desarrollado tanto para aplicación foliar como vía radicular y puede aplicarse en todo tipo de cultivos, especialmente en aquellos con una fuerte demanda de potasio como por ejemplo olivar, patata, cucurbitáceas y cítricos entre otros:

MÉTODO DE APLICACIÓN			
Cultivos	Momento de aplicación	Dosis radicular	Dosis foliar
Frutales de hueso	En frutales de hueso, utilizar desde endurecimiento de hueso hasta 7 días antes de recolección.	7-15kg/ha	0,2-0,3%
Frutales de pepita	En frutales de pepita, utilizar desde inicio de engorde del fruto.	7-15kg/ha	0,2-0,3%
Olivo	Desde endurecimiento de hueso hasta recolección	7-12kg/ha	0,4%
Cítricos	Aplicar desde inicio de engorde hasta 10 antes de recolección	5-10kg/ha	0,3%
Vid y uva de mesa	Aplicar desde envero hasta la recolección del fruto	5-10kg/ha	0,3%
Hortícolas de fruto	En hortícolas de fruto, utilizar desde engorde hasta final de maduración.	7-15kg/ha	0,2-0,4%
Hortícolas de hoja	En hortícolas de hoja, aplicar durante el ciclo, especialmente en la fase final de maduración.	7-15kg/ha	0,2-0,4%
Hortícolas de bulbo-raíz-tubérculo	En hortícolas de bulbo/tubérculo aplicar desde el inicio de la formación.	7-15kg/ha	0,2-0,4%
Tropicales	Desde inicio de engorde hasta 10 antes de recolección	5-10kg/ha	0,4%

Indicaciones de uso

Rombi® KS SP es un producto muy soluble que no presenta complicaciones a la hora de su preparación. No es necesaria una disolución previa. En caso de mezcla, se recomienda seguir el orden adecuado para evitar interferencias físicas. Se recomienda realizar siempre el tratamiento con condiciones meteorológicas favorables para la aplicación.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). PLYMAG, S.L. garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.