



FICHA TÉCNICA



LORSBAN SK 2.5% DP
INSECTICIDA AGRÍCOLA
POLVO SECO (DP)
REGISTRO ICA No. PL0001122025
A NOMBRE DE SODIAK S.A.



INGREDIENTES ACTIVOS:

Fenitrothion 25 g/kg

0,0-dimethyl 0-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate

Ingredientes aditivos c.s.p. 1 Kg

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN:

Lorsban SK 2.5% DP es un insecticida organofosforado. Su modo de acción es por contacto, inhalación e ingestión.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

LORSBAN SK 2.5 % DP es un insecticida perteneciente al grupo de los organofosforados recomendado para controlar plagas masticadoras, chupadoras y perforadoras en diferentes cultivos. Es un producto no sistémico, con acción de contacto y estomacal. Tiene efecto sobre la transmisión nerviosa, mediante la inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa. El efecto es inmediato ya que tiene un efecto de volteo rápido. Posee buena persistencia, efecto de choque y acción en profundidad. Se caracteriza por su rápido efecto inicial, notable acción penetrante y persistencia de 2-3 semanas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C.	L.M.R.	P.R.
CAFÉ	Hormiga arriera <i>(Atta cephalotes)</i>	30 g/m ² de hormiguero	NA	0.05 mg/kg *	0 horas
MAÍZ				6 mg/kg**	
PASTOS				6 mg/kg**	

P.C: Período de carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

N.A.: No aplica

L.M.R.: Límite máximo de residuos: Fuente: * European Commission. / ** Codex Alimentarius

Nocivo en caso de Ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala.

Muy tóxico para
organismos acuáticos.



PELIGRO



LORSBAN SK 2.5% DP
INSECTICIDA AGRÍCOLA
POLVO SECO (DP)
REGISTRO ICA No. PL0001122025
A NOMBRE DE SODIAK S.A.

FICHA TÉCNICA

Lorsban™ SK
2.5% DP



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

El daño por hormiga arriera (*Atta cephalotes*) depende del nivel de infestación y el estado fenológico del cultivo. Se recomienda aplicar preferiblemente, cuando las plantas presenten los primeros síntomas de ataque por la plaga.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Se recomienda aplicar con insufladora o bomba neumática, tapando las bocas del hormiguero por las que vaya saliendo el producto, hasta que todas las bocas queden selladas.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

Fecha de Aprobación ICA: 14/04/2025

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO

SODIAK S.A.

Autopista Medellín km 1.5 vía Bogotá Siberia, Parque Agroindustrial de Occidente, Bodega 3, Local 113
Teléfono 57-1 864 3232, Cota, Cundinamarca
www.sodiak.com.co

