

BLOQUE



# Curbix<sup>®</sup> FUSION

Insecticida Agrícola

Suspensión concentrada - SC

Neonicotinoide + Phenylpyrazole

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Imidacloprid: .....  
de formulación a 20°C

Ethiprole: .....  
de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos: ..... c.s.p 1 litro



Registro Nacional ICA No.  
Titular del Registro: Bayer S.A.

## CONTENIDO NETO:

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

Bayer S.A. Carrera 50 Calle 8 vía Soledad. Barranquilla-  
Colombia

Distribuido por:

Bayer S.A., Av. Américas 57 -52  
Línea 01 8000 111212, Bogotá D.C. - Colombia



® Marca Registrada  
Franja Amarilla



II MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO



# Curbix® FUSION

Insecticida Agrícola

Suspensión concentrada - SC

Neonicotinoide + Phenylpyrazole

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### Ingredientes activos:

Imidacloprid: ..... 100 g/litro  
de formulación a 20°C

Ethiprole : ..... 100 g/litro  
de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos: ..... c.s.p 1 litro

Registro Nacional ICA No. \_\_\_\_\_  
Titular del Registro: Bayer S.A.

### CONTENIDO NETO:

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Formulado:

Importado y Distribuido por:



® Marca Registrada  
Franja Amarilla



II MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

BLOQUE 2



**Curbix® FUSION**

Insecticida Agrícola

Suspensión concentrada - SC  
Neonicotinoide + Phenylpyrazole



**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**

**Ingredientes activos:**

**Imidacloprid:** .....  
de formulación a 20°C

**Ethiprole:** ..... **100 g/litro**  
de formulación a 20°C

**Ingredientes aditivos:** ..... **c.s.p 1 litro**

**Registro Nacional ICA No.**  
**Titular del Registro: Bayer S.A.**

**CONTENIDO NETO:**

**No. de Lote:**

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**Formulado por:**

Bayer S.A. Bayer CropScience. Area proteção dos Plantas.  
Estrada da Boa Esperança, No, 650.26100-100 Belford  
Roxo. Rio de Janeiro. Brasil.

**Importado y Distribuido por:**

Bayer S.A., Av. Américas 57 -52  
Línea 01 8000 111212, Bogotá D.C. - Colombia



© Marca Registrada  
Franja Amarilla



**II MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

BLOQUE 2



**Curbix<sup>®</sup>** FUSION

Insecticida Agrícola

Suspensión concentrada - SC

Neonicotinoide + Phenylpyrazole

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**

**Ingredientes activos:**

**Imidacloprid:** ..... **100 g/litro**  
de formulación a 20°C

**Ethiprole:** ..... **100 g/litro**  
de formulación a 20°C

**Ingredientes aditivos:** ..... **c.s.p 1 litro**

**Registro Nacional ICA No.**  
**Titular del Registro: Bayer S.A.**

**CONTENIDO NETO:**


**No. de Lote:**

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**Formulado por:**

**Importado y Distribuido por:**



Bayer S.A. Bayer CropScience. Camino de la Costa Brava  
S/N.-Zarate Industrial Park.2800 Zarate. Argentina

Bayer S.A., Av. Américas 57-52  
Línea 01 8000 11212, Bogotá D.C. - Colombia



® Marca Registrada  
Franja Amarilla



**II MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

BLOQUE 2



**Curbix**<sup>®</sup> FUSION

Insecticida Agrícola  
Suspensión concentrada - SC  
Neonicotinoide + Phenylpyrazole



**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**

**Ingredientes activos:**

**Imidacloprid:** ..... **100 g/litro**  
de formulación a 20°C

**Ethiprole:** ..... **100 g/litro**  
de formulación a 20°C

**Ingredientes aditivos:** ..... **c.s.p 1 litro**

**Registro Nacional ICA No.**  
**Titular del Registro: Bayer S.A.**

**CONTENIDO NETO:**

**No. de Lote:**

**Fecha de Formulación:**

**Fecha de Vencimiento:**

**Formulado por:**

Bayer AG Industriepark Höchst 65926 Frankfurt . Alemania

**Importado y Distribuido por:**

Bayer S.A., Av. Américas 57 -52  
Línea 01 8000 111212, Bogotá D.C. - Colombia



® Marca Registrada  
Franja Amarilla



**II MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

BLOQUE 2



**Curbix<sup>®</sup>** FUSION

Insecticida Agrícola

Suspensión concentrada - SC

Neonicotinoide + Phenylpyrazole

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA:**

**Ingredientes activos:**

**Imidacloprid:** ..... 100 g/litro  
de formulación a 20°C

**Ethiprole:** ..... 100 g/litro  
de formulación a 20°C

**Ingredientes aditivos:** ..... c.s.p 1 litro

Registro Nacional ICA No.  
Titular del Registro: Bayer S.A.

**CONTENIDO NETO:**


No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

Importado y Distribuido por:



Bayer SAS. Bayer CropScience. Industrial Operations –  
Villefranche. 1 boulevard Edouard Herriot. 69400  
Villefranche-Limas. France

Bayer S.A., Av. Américas 57 -52  
Línea 01-8000 111212, Bogotá D.C. - Colombia



® Marca Registrada  
Franja Amarilla



**II MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

## BLOQUE 1.

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE  
ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS  
UTILIZAR GUANTES PARA LAS ACTIVIDADES DE MANEJO, APLICACIÓN Y REENTRADA  
AGÍTELO ANTES DE DESTAPAR Y USAR EL PRODUCTO**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

**PELIGROSO SI ES INHALADO. EVITE RESPIRAR ( POLVO, VAPOR O ASPERSIÓN)**

- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular; guantes, camisa de manga larga, pantalón largo y calzado resistente, al aplicar el producto utilizar guantes, camisa de manga larga, pantalón largo y calzado resistente y para ingresar al área tratada antes de terminar el periodo de re-entrada utilizar guantes, camisa de manga larga, pantalón largo y calzado resistente.
- **No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.**
- **Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.**
- Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calibrelo previamente.
- No sople con la boca las boquillas obstruidas; utilice un cepillo para destaparlas.
- Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- No permita animales en el área tratada
- **Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto. No utilizar este envase para ningún otro propósito.**
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y animal.



### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta adjunta.**
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón y lleve al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire.
- En caso de ingestión no provocar el vómito y lleve al paciente inmediatamente al médico, junto con esta etiqueta.

### GUÍA PARA EL MÉDICO.

- Medidas de descontaminación general. El lavado gástrico no es recomendado.
- No hay un antídoto específico, por lo tanto cualquier tratamiento debe ser sintomático y de soporte.
- Mantener libres las vías respiratorias.

- Adicionalmente colestiramina 12-16 g/día puede ser administrado para acelerar la eliminación en casos muy severos.
- En casos de intoxicación severa, se han observado convulsiones tónicoclónicas. Se debe administrar Diazepam 10-15mg IV a criterio médico, seguido por benzodiazepinas con protección de vía aérea y oxigenación adecuada.
- La aparición de los síntomas puede retrasarse debido a la lenta absorción del compuesto. Así, en caso de ingestión de más de una bocanada, el paciente debe ser hospitalizado durante al menos 48 horas para observación y potencial tratamiento.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (arena o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseche acorde con la entidad local competente.
- No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- Tóxico para peces. No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
- Respetar las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial, 10 metros (terrestre).
- Tóxico para aves.
- **Altamente tóxico para abejas, Puede matar insectos polinizadores. No aplicar este producto en presencia o actividad de insectos polinizadores o en época de floración del cultivo. No aplicar en horas de alta actividad de abejas. Aplicar temprano en la mañana o al final de la tarde. No aplicar cuando haya malezas en floración. Remover las malezas antes de la floración.**
- No se recomiendan aplicaciones aéreas.

**NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO**

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN, EVITANDO SALPICADURAS. LUEGO INUTILICELO TRITURANDOLO O PERFORANDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.\*\***

**\*\* LLEVE EL ENVASE AL CENTRO DE ACOPIO MAS CERCANO DEL PROGRAMA CAMPO LIMPIO, LUEGO DE REALIZAR EL TRIPLE LAVADO.**

**EN CASO DE INTOXICACION, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM: LINEA 01 8000 916012 ATENCION 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL Tel. (091) 2 88 60 12.**

**LINEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 11212.**

**Fecha de Aprobación ICA: --/--/--**

**Franja Amarilla**



### BLOQUE 3

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

#### CONSULTE UN INGENIERO AGRONOMO

UTILIZAR GUANTES PARA LAS ACTIVIDADES DE MANEJO, APLICACIÓN Y REENTRADA  
AGITELO ANTES DE DESTAPAR Y USAR EL PRODUCTO


CULTIVO	PLAGA	DOSIS	<sup>1</sup> P.C.	<sup>2</sup> P.R.
CAFÉ	Broca del café <i>Hypothenemus hampei</i>	2.0 L/ha	40 días	12 horas

<sup>1</sup>P.C. **Periodo de carencia:** Tiempo entre la aplicación y la cosecha

<sup>2</sup>P.R. **Periodo de re-entrada:** periodo restringido (no prohibido) entre la aplicación y la re-entrada del personal al área aplicada (ver tiempo en el cuadro de uso). Si requiere realizar alguna labor antes de cumplirse el periodo de re-ingreso, debe utilizarse el equipo de protección overol, botas y guantes.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

**Café:** Realizar una aplicación por aspersion foliar cuando el grano tiene mayor susceptibilidad al ataque (90 a 120 días después de floración) con un nivel de infestación no mayor al 2%. Aplicar con volúmenes de 400 litros de agua por hectárea.



Se recomienda la aplicación de CURBIX® FUSION con base en los resultados del monitoreo y el umbral de acción, de presentarse una nueva infestación de la plaga en el mismo ciclo productivo, se sugiere realizar el control siguiendo un programa de rotación con otros insecticidas de diferente mecanismo de acción, acatando las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Insecticidas - IRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.

**Aplique a partir de los 90 días después de la floración.**

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:** Antes de realizar mezclas con CURBIX® FUSION debe realizarse previamente pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar y fito-compatibilidad, en pequeña escala.

CURBIX® FUSION en las dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo se recomienda pruebas de fito-compatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.

#### INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Franja Amarilla

