

Composición:Extracto natural de *Reynoutria sachalinensis* 224 g/L**Características físicas y químicas:**

Familia química:	Extracto de plantas
Clasificación toxicológica (GHS / OMS)	IV
Usos:	Fungicida botánico de uso agrícola
Código FRAC	P 05 Inductores de antraquinona

Modo y mecanismo de acción:

Es un bio fungicida preventivo que afecta la germinación de las estructuras reproductivas del hongo y estimula las defensas de la planta aumentando la producción de fitoalexinas, compuestos fenólicos y antioxidantes, haciendo que la planta responda de manera eficiente al efecto del ataque de los patógenos. Brinda un efecto vigorizante al cultivo.

Equipo de aplicación:

Usar equipos convencionales de aspersión terrestre. Utilice equipos limpios y debidamente calibrados, asegurando una aplicación uniforme y una cobertura apropiada.

Forma de preparación de la mezcla:

El producto debe ser incorporado al caldo de aspersión a través de una pre mezcla en una parte del volumen final de aplicación.

Recomendaciones de usos:

Cultivo		Enfermedad		Dosis
Ornamentales	Rosa	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	1,5 L/ha
		Mildeo polvoso	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	2 L/ha
Aguacate	Persea americana	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	1,5 L/ha
Banano	Musa x paradisiaca	Sigatoka	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	1,5 L/ha

Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

No aplica

Intervalo de reingreso al área tratada:

No aplica

Fitotoxicidad:

No se han observado síntomas de fitotoxicidad de REGALIA® cuando es usado en las dosis recomendadas y siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

Compatibilidad:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad al mezclar REGALIA® con otros productos.

Registro de venta ICA:

9432