

### 1. Composición:

Glyphosate..... 680 g/Kg  
N-(phosphonomethyl)-glycine de formulación, equivalente a 747 g/Kg de glyphosate monoamonium, por Kg de formulación.

### 2. Características del producto:

Familia química: Glicinas  
Clasificación toxicológica (OMS): III Ligeramente Peligroso  
Usos: Herbicida  
Código HRAC: Grupo G

### 3. Modo y mecanismo de acción:

BROKER 747 SG, es un herbicida no selectivo, sistémico que es traslocado por el sistema vascular desde las hojas llegando hasta la raíz de las malezas, es ideal para el control de una gran variedad de malezas anuales y perennes. Es un Inhibidor de la EPSP sintasa.

### 4. Equipo de aplicación:

Aplicaciones terrestres con bomba de espalda, con volúmenes aproximado de 200 L/Ha. Se recomienda utilizar boquillas de abanico plano de baja descarga

### 5. Recomendaciones de uso:

Cultivos autorizados para Colombia:

Cultivo	Maleza	Dosis
Maíz ( <i>Zea mays</i> )	Chilinchile ( <i>Cassia Tora</i> ), Coquito ( <i>Cyperus rotundus</i> ), Flor Blanca ( <i>Sida rhombifolia</i> ), Lantana ( <i>Lantana sp</i> ), Pajamona ( <i>Leptochloa filiformis</i> ), Caminadora ( <i>Rottboellia exaltata</i> ), Batatilla ( <i>Ipomoea congesta</i> ) Palo de agua ( <i>Jussiaea linifolia</i> )	2 Kg/ha
Potrereros	Bledo ( <i>Amaranthus dubius</i> ) Coquito ( <i>Cyperus Rotundus</i> ). Tabaquillo ( <i>Emillia sonchifolia</i> ) Brachiaria ( <i>Brachiaria decumbens</i> ) Escoba ( <i>Sida acuta</i> ) Pega Pega ( <i>Desmodium tortuosum</i> ) Amor Seco ( <i>Bidens pilosa</i> ) Dormidera ( <i>Mimosa pudica</i> )	2 Kg/ha

BROKER 747 SG es un herbicida no selectivo por lo tanto debe ser aplicado en presiembra cuando las malezas se encuentren en activo crecimiento y que no hayan alcanzado el estado de floración. Es importante que exista una adecuada humedad en el suelo. No deben realizarse aplicaciones si se esperan lluvias seis horas después de la aplicación.

### 6. Intervalo de aplicación:

Una aplicación en presiembra al cultivo y postemergencia temprana de las malezas

### 7. Intervalo entre la última aplicación y la cosecha:

15 días

### 8. Intervalo de reingreso al área tratada:

6 horas

### 9. Fitotoxicidad:

BROKER 747 SG, es un herbicida no selectivo por lo tanto puede afectar los cultivos. Es muy importante evitar que la deriva de aplicación llegue a cultivos cercanos.

### 10. Compatibilidad:

Se recomienda no mezclar BROKER 747 SG con herbicidas de contacto y hormonales o con formulaciones en polvo mojables o suspensiones concentradas.

### 11. Registro de Venta ICA:

Registro Nacional ICA 1110

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO.

Versión 03. 2020