Opera® SC

Fungicida • Suspensión concentrada • Categoría toxicológica: III

BASF
The Chemical Company

Reg. ICA 3935

Ingrediente activo

Epoxiconazole 50 g/l + Pyraclostrobin 133 g/l.

Modo de acción

Opera® SC es un fungicida de acción sistémica, translaminar y mesosistémica.

Mecanismo de acción

• *Epoxiconazole:* es una molécula que pertenece al grupo de los triazoles que inhibe la biosíntesis del ergosterol en la membrana celular del hongo.

• *Pyraclostrobin:* es una estrobirulina que inhibe la respiración mitocondrial interrumpiendo el transporte de electrones en el complejo III. Actúa sobre oomicetos y un gran grupo de hongos tales como deuteromicetos y ascomicetos.

Presentaciones

250 cc, 1L y 5L.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Blanco biológico (Nombre científico y nombre común)	Dosis	Periodo de carencia	Periodo de reentrada
Clavel	Mancha anular *(Heterosporium echinulatum)*	0.7 cc/L	NA	6 horas
Cebolla	Mancha púrpura *(Alternaria porri)*	0.6 cc/L	30 días	Cuando el follaje seque completamente
Tomate de árbol	Antracnosis *(Colletotrichum gloesporoides)*	0.5 cc/L	20 días	Cuando el follaje seque completamente
Soya	Roya suramericana *(Phakopsora meibomiae)*	0.5 L/ha	14 días	Cuando el follaje seque completamente
Maíz	Mancha del follaje *(Helminthosporium maydis)*	0.75 L/ha	14 días	Cuando el follaje seque completamente

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Frecuencia y época de aplicación

- *Clavel:* Aplicar Opera® SC para el control de la mancha anular *(Heterosporium echinulatum)* en esquemas preventivos-curativos tempranos o cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad y las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la misma. Realizar máximo dos aplicaciones en bloque y rotar con otros mecanismos de acción.
- *Cebolla:* Aplicar Opera® SC de manera preventiva-curativa temprana o cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad y las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la misma. Realizar de 2 - 3 aplicaciones durante el ciclo del cultivo, rotando con fungicidas de diferente mecanismo de acción.
- *Tomate de árbol:* Aplicar Opera® SC en esquema preventivo-curativo temprano o cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad y las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la misma.
- *Soya:* Aplicar Opera® SC en esquema preventivo-curativo temprano o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad, en estado de prefloración o floración temprana y repetir la aplicación a los 20 días después de la primera aplicación.
- *Maíz*: Aplicar Opera® SC en esquema preventivo-curativo temprano o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad, en estado de prefloración o floración temprana y repetir la aplicación en posfloración.

Preparación de la mezcla

El tanque del equipo se debe llenar hasta la mitad con agua, luego agregar Opera® SC agitando continuamente y completar el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogenizar la mezcla. Realice el triple lavado del envase y agréguelo a la mezcla. La mezcla se debe aplicar después de preparada.

Compatibilidad

Se recomienda realizar pruebas de fito-compatibilidad con Opera® SC en mezcla con otros productos agroquímicos.
Opera® SC es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso corriente; no se debe mezclar con productos de reacción alcalina, como caldo Bordelés.

Contenido