



MATA MOSCAS

Registro Sanitario de Uso en Salud Pública No: 2021RGSP-0000004

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Zyrox ® Mosca cebo granulado es un cebo insecticida que actúa por ingestión y contacto, con novedoso modo de acción y atractiva formulación, para el control de moscas y cucarachas causando letargia y parálisis progresiva y letal; los insectos dejan de moverse, ya no se alimentan y mueren progresivamente.

2. GENERALIDADES

Ingredientes Activos:	Cyantraniliprole
Nombre Químico: (IUPAC)*	3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridyl)-4'-cyano-2'-methyl-6'-(methylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide.
Formulación:	GR – Cebo granulado de aplicación directa.
Concentración:	0.5% de Cyantraniliprole
Nombre Comercial:	ZYROX® MOSCA CEBOS GRANULADOS
Fórmula Estructural:	Cyantraniliprole
Fórmula Empírica:	C ₁₉ H ₁₄ BrClN ₆ O ₂
Peso Molecular:	473.72 g/mol
Grupo Químico:	Diamida

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.

3. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN

Estado Físico:	Sólido
Color	Amarillo claro – Amarillo café

4. TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

Categoría IV – Ligeramente tóxico

INDICACIONES PARA USO MÉDICO

Grupo Químico: Diamida antranílica

Antídoto y Tratamiento: no existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

Teléfono de emergencias 24 horas: en caso de emergencia comuníquese con la línea de Cisproquim: 018000916012 o al (571) 2886012.

Medidas relativas a primeros auxilios: por ingestión: lleve inmediatamente al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. No induzca el vómito. **Por inhalación:** retire al paciente del lugar de exposición y manténgalo en reposo. Como precaución acuda al médico. **Por contacto con la piel:** lávese la piel con abundante agua, si la irritación persiste contacte al médico. **Por contacto con los ojos:** lave inmediatamente con abundante agua, durante 15-20 minutos como mínimo. Acuda al médico inmediatamente.

Síntomas: puede producir irritación ocular y visión borrosa; puede causar irritación, enrojecimiento de la piel y sensibilización dérmica; irritación del tracto respiratorio. Todos estos síntomas son reversibles.

Precauciones: antes de aplicar este producto proteja los alimentos y enseres de cocina. Evítese el contacto con los ojos, no coma, beba, ni fume durante el uso y manejo de este producto. Evite la ingestión de este producto, no lo huela y no lo aplique sin guantes. Evite que los niños y animales domésticos tengan acceso a los puntos de cebado. Antes de comer, beber, fumar o dedicarse a otra actividad, lávese las manos con abundante agua y jabón.

Advertencia:

“EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS”

“NO CONTAMINE FUENTES DE AGUA”

“ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS”

“PUEDE MATAR INSECTOS POLINIZADORES”

“EL PRODUCTO SOLO DEBE SER APLICADO AL INTERIOR DE INSTALACIONES Y NO DEBE INGRESAR AL AMBIENTE EXTERNO”

Almacenamiento y manejo del producto: almacenar en un lugar fresco y seco, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal. Medidas relativas para la disposición de envases vacíos: no emplear este envase para ningún otro fin. No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases. Después de usar el contenido, colóquelo en un contenedor y disponga de acuerdo a la normativa vigente o local.

Medidas relativas para la protección del ambiente: tóxico para organismos acuáticos. No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes de producto o envases vacíos.

5. PROPIEDADES BIOLÓGICAS

Mecanismo de acción:

Insecticida sistémico que funciona al alterar la regulación de las contracciones musculares que causan parálisis y finalmente la muerte en los insectos.

6. CAMPOS DE APLICACIÓN (USOS) Y DOSIS

Recomendaciones de uso y dosis:

Aplique directamente en ambientes interiores donde se desee controlar moscas que representen un riesgo para la salud pública.

Plagas	Dosis para áreas de 20 m ²	Indicaciones
Moscas domésticas, Moscas de la carroña, Mosca de la fruta, Moscas de establo, Mosca negra, Pequeña mosca marrón de las heces.	Alta: 20 g Baja: 16 g	Aplique el cebo con equipos para esparcir granulados. Adherir en cartones con adhesivo o en estaciones de cebado para moscas. Para aplicación focalizada (spot): realice una dilución en agua tibia en proporción de 1 parte de cebo con 10 a 15 partes de agua y aplique con brocha en interiores de instalaciones en sitios altos de reposo de moscas en: paredes, columnas, postes, travesaños, vigas, marcos de puertas y ventanas, aleros e impregnación de cuerdas y tarjetas de cartón. Si requiere aspersión focalizada (spot) diluya en un volumen mayor de agua.

		Aplique el cebo en instalaciones cerradas en: áreas habitacionales, hoteleras, educativas, comerciales (tiendas y supermercados), restaurantes, industriales, industrias alimentaria y farmacéutica, áreas de proceso, rastros, empacadoras, bodegas, almacenes, instalaciones de aeropuertos, hospitales, instalaciones militares, en sitios de criadero de moscas como depósitos de basura, sitios donde se acumula materia orgánica. No permita que el producto ingrese al ambiente externo.
Cucaracha alemana Cucaracha asiática		Cucarachas: Colocar directamente los gránulos en las trampas engomadas de monitoreo o cebaderos para cucarachas.

Periodo de reentrada: Inmediata al término de aplicación, ya que la aplicación es focalizada en cebaderos o en sitios de anidamiento de la plaga

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

Importado y distribuido por:
Syngenta S.A.